

Cavinton (vinpocetin) - rövid tájékoztató infúziós kezeléshez

Mit kap és miért?

Cavinton (hatóanyag: vinpocetin) az agyi keringést és agyműködést javító szer. Infúzióban adják, ha szájon át nem lehetséges vagy gyors hatás szükséges (pl. stroke utáni állapotok, TIA, egyes szédüléssel vagy hallásproblémák, retina keringészavarok).

A beavatkozás jellege és menete

Járóbetegként, orvosi vizsgálat után történik, orvos felügyeletével, képzett szakdolgozó végzi szakmai protokolloknak megfelelően. A bőrt fertőtlenítik, majd vénába vezetnek egy tűt (kanült). Az infúziós palack/ampulla erre csatlakozik. Az infúzió ideje alatt nyugalomban kell feküdni. Az infúzió után a tűt eltávolítják, a szúrás helyét leragasztják, rövid ideig nyomni kell. Pár perc pihenés után hazamehet.

Lehetséges, leggyakoribb szövődmények, mellékhatások (amit Ön érezhet)

Helyi reakciók: az infúzió a véna mellé folyhat, feszítő, csípő érzés; vénagyulladás; vérömleny (kék folt). Neurológiai/fül-orr-gégészeti: fejfájás, szédülés, forgó jellegű szédülés, egyensúlyzavar, halláscsökkenés vagy fülzúgás (tinnitus), aluszékonyosság, ingerlékenység. Érzészavarok/melegség: paresthesia (bizsergés), melegség- vagy hőérzet a testen. Szív- és érrendszer: kipirulás, hőhullám, szapora szívverés, ritmuszavarok ritkán, vérnyomásváltozás (esetenként csökkenés vagy ingadozás). Emésztőrendszer: hányinger, hányás, gyomorfájdalom, hasmenés, epigasztrikus panaszok. Bőr és allergia: viszketés, kiütés, csalánkiütés, angioödéma; ritkán súlyos allergiás reakciók (anaphylaxia). Egyéb ritkább tünetek: izzadás, általános rossz közérzet. Súlyos tünetek: légzési nehézség, nagy kiterjedésű bőrkiütés, erős vérzés, ájulás, ezeknél azonnal jelezze a személyzetnek vagy hívjon segítséget.

Mikor NEM adható / mire figyeljen?

Ellenjavallt: ismert túlérzékenység a vinpocetinre vagy segédanyagokra; akut vérzéses agyi esemény; súlyos ischaemiás szívbetegség vagy súlyos szívritmuszavar; terhesség és szoptatás; gyermekkorban (ellenjavallt). Külön óvatosság szükséges: súlyos máj- vagy vesebetegség, hosszú QT-szindróma vagy egyes antiarrhythmikumok mellett, ilyenkor EKG/ellenőrzés lehet szükséges. A készítmény ampullánként benzil-alkoholt, szorbitot és nátrium-metabiszulfidot tartalmaz, ha ezekre érzékeny, jelezze.

Gyógyszerkölsönhatások

Heparinnal azonos fecskendőbe nem keverhető (kémiai inkompatibilitás). Egyes gyógyszerek (antiarrhythmikumok, központi idegrendszerre hatók) együttes alkalmazásakor óvatosság és megfigyelés javasolt. Mindig közölje az orvossal a szedett gyógyszereit. Terhesség és szoptatás alatt a vinpocetin alkalmazása ellenjavallt, tájékoztassa orvosát, ha terhes vagy szoptat.

Mit tegyen a kezelés után?

Egy-két perc pihenés után távozzon. Ha a szúrás helyén fájdalom, vörösség vagy duzzanat jelentkezik, jelentse a kezelőnek vagy házi orvosának. Ha gyógyszeres mellékhatásokat vagy súlyos tüneteket észlel, haladéktalanul forduljon az egészségügyi személyzethez vagy hívjon segítséget.

Kérem, olvassa el a tájékoztatót otthon nyugodt körülmények között is. Ha elolvasta, tegye fel kérdéseit, javasolt a kérdéseket előre felírni; a felmerülő kérdésekre a kezelőorvos/nővér igyekszik választ adni. Amennyiben további részletes tájékoztatásra van szüksége, kérjük, egyeztessen időpontot vagy hívja a rendelőt így biztosan választ kap minden kérdésére.