

Ferrlecit (vas) - rövid tájékoztató infúziós injekcióról

Mit kap és miért?

Ferrlecit intravénás vaspótló készítmény. Olyan vashiányos állapotokban adják, amikor a szájon át szedés nem lehetséges vagy nem hatásos.

A beavatkozás jellege és menete

Járóbetegként, orvosi vizsgálat után történik, orvos felügyeletével, képzett szakdolgozó végzi szakmai protokolloknak megfelelően. A bőrt fertőtlenítik, vénába tűt vagy kanült helyeznek, majd lassú intravénás injekcióként vagy hígítva 20–30 perces infúzióként adják be. A beadás közben és után megfigyelik Önt (legalább 30 perc megfigyelés javasolt). A kezelés után rövid pihenés után távozhat.

Lehetséges, leggyakoribb szövődmények és mellékhatások (amit Ön érezhet)

Az infúzió a véna mellé folyik: feszítő, csípő érzés, helyi fájdalom. Vénagyulladás a szúrás helyén: vörösség, fájdalom, duzzanat. Vérömleny (kék folt) a szúrás helyén.

Általános/gyakori: hányinger, hányás, fejfájás, szédülés, szívdobogásérzés, vérnyomás-ingadozás, láz, izom-/ízületi fájdalom. Ritkábban: nehézlégzés, erős bőrkiütés, arcduzzanat, anafilaxiás jellegű reakciók, ezeknél azonnal értesítse a személyzetet. Nagyon ritkán: vasszint túltöltődése, hemolízis, súlyos allergiás események, keringési zavarok. Műveskezelés alatt álló gyermekeknél és speciális helyzetekben egyéb tünetek is előfordulhatnak (lásd orvosi tájékoztató).

Mikor NEM adható / fontos figyelmeztetések

Nem adható: ismert túlérzékenység a készítményre vagy korábbi súlyos reakció más vasinjekcióra; bizonyos vas-tárolási betegségek (pl. hemokromatózis), akut leukémia; súlyos máj- vagy vesebetegség; terhesség első 12 hete; 3 év alatti gyermekek; súlyos gyulladással járó állapotok. Figyelmeztesse az orvost: korábbi allergia, asztma, reumás vagy autoimmun betegség, máj-/veseprobléma, gyógyszeresedés (különösen ACE-gátló), ha terhes vagy szoptat. A Ferrlecit ampulla benzil-alkoholt és szacharózt tartalmaz — érzékenység vagy kisgyermek esetén fontos jelezni. A beadás nagyon lassan, fekvő helyzetben történik, hogy elkerüljék súlyos reakciókat.

Mire figyeljen gyógyszerek és állapotok esetén?

Mondja el, ha vérnyomáscsökkentőt (ACE-gátlót) szed, vagy ha máj/veseproblémája, autoimmun betegsége van. Terhesség/ szoptatás esetén konzultáljon az orvossal — első 12 hétben általában kerülendő; szoptatás alatt mérlegelni kell a kockázatokat.

Mit tegyen a kezelés után?

Rövid megfigyelés után hazamehet. Ha a szúrás helyén fokozódó fájdalom, vörösség, láz vagy duzzanat jelentkezik, vagy ha légzési nehézség, kiütés, ájulás, véres vizelet, sápadtság alakul ki, azonnal forduljon orvoshoz vagy hívja a sürgősséget. Ha elmarad egy adag, az orvos dönt a pótlásról; soha ne pótolja pluszba szájon keresztül önállóan.

Kérem, olvassa el a tájékoztatót otthon nyugodt körülmények között is. Ha elolvasta, tegye fel kérdéseit, javasolt a kérdéseket előre felírni; a felmerülő kérdésekre a kezelőorvos/nővér igyekszik választ adni. Amennyiben további részletes tájékoztatásra van szüksége, kérjük, egyeztessen időpontot vagy hívja a rendelőt így biztosan választ kap minden kérdésére.