

Lucetam (piracetam) - Tájékoztató infúziós kezelésről

Mit kap és miért?

Lucetam (hatóanyag: piracetam) az agyműködést támogató gyógyszer (memória, figyelem, tanulás segítése). Infúzióban adják, ha szájon át nem lehetséges vagy gyors hatás.

A beavatkozás jellege és menete

Járóbetegként, orvosi vizsgálat után történik, orvos felügyeletével, képzett szakdolgozó végzi szakmai protokolloknak megfelelően. A bőrt fertőtlenítik, majd vénába vezetnek egy tűt (kanült). Az infúziós palack/ampulla erre csatlakozik. Az infúzió ideje alatt nyugalomban kell feküdni. Az infúzió után a tűt eltávolítják, a szúrás helyét leragasztják, rövid ideig nyomni kell. Pár perc pihenés után hazamehet.

Lehetséges, leggyakoribb szövődmények, mellékhatások (amit Ön érezhet)

Az infúzió a véna mellé folyik: feszítő, csípő érzés, helyi fájdalom. Vénagyulladás a szúrás helyén: vörösség, fájdalom, duzzanat. Vérömleny (kék folt) a szúrás helyén. Gyógyszeres mellékhatások: fokozott motoros aktivitás, testsúlynövekedés, idegesség, Gyomor és bélrendszeri panaszok: hasi fájdalom, hasmenés, émelygés, hányás. Bőrtünetek: bőrgyulladás, csalánkiütés, allergiásreakciók, mély bőrgyulladások (angioödéma), immunrendszer zavarai: súlyos allergiás reakciók, túlérzékenység. Idegrendszeri tünetek: mozgászavar, egyensúlyzavar, epilepszia súlyosbodása, fejfájás, álmatlanság, aluszékonyság, forgó jellegű szédülés. Súlyos tünetek (pl. légzési nehézség, nagy kiterjedésű bőrkiütés, erős vérzés) esetén azonnal jelezze a szakdolgozónak vagy az orvosnak.

Mire figyeljen egyes állapotok és gyógyszerek esetén?

Ha Ön véralvadásgátlót, vérlemezke-gátlót (vagy gyakori aszpirint) szed, vagy vérzékenysége, gyomorfekélye van: a Lucetam befolyásolhatja a véralvadást, tájékoztassa az orvost. Veseprobléma esetén az orvos külön figyelmet fordít a kezelésre. Terhesség és szoptatás: általában nem adható, mindig beszélje meg az orvossal. Tájékoztassa az orvost minden szedett gyógyszerről (beleértve a pajzsmirigy-hormonokat és epilepszia elleni szereket).

Egyéb választható kezelések

Orvosa mérlegelheti a szájon át szedhető piracetamot (ha lehetséges), más gyógyszereket vagy alternatív kezelési módokat. Kérdezzen rá, ha szeretne alternatívát.

Mit tegyen a kezelés után?

Egy-két perc pihenés után távozzon. Ha a szúrás helyén fájdalom, vörösség vagy duzzanat jelentkezik, jelentse a kezelőnek vagy házi orvosának. Ha gyógyszeres mellékhatásokat vagy súlyos tüneteket észlel, haladéktalanul forduljon az egészségügyi személyzethez vagy hívjon segítséget.

Kérem, olvassa el a tájékoztatót otthon nyugodt körülmények között is. Ha elolvasta, tegye fel kérdéseit, javasolt a kérdéseket előre felírni; a felmerülő kérdésekre a kezelőorvos/nővér igyekszik választ adni. Amennyiben további részletes tájékoztatásra van szüksége, kérjük, egyeztessen időpontot vagy hívja a rendelőt így biztosan választ kap minden kérdésére.