

---

## Neodolpasse (diklofenák + orfenadrin) - rövid tájékoztató infúziós kezeléshez

### Mit kap és miért?

Neodolpasse infúzió diklofenákot (fájdalom- és gyulladáscsökkentő) és orfenadrint (izomlazító) tartalmaz. Akut, erős fájdalom és gyulladás (pl. műtét utáni fájdalom, gerinc- vagy reumás fájdalom) gyors tüneti enyhítésére adják, ha szájon át nem megfelelő vagy orvos így rendeli.

### A beavatkozás jellege és menete

Járóbetegként, orvosi vizsgálat után történik, orvos felügyeletével, képzett szakdolgozó végzi szakmai protokolloknak megfelelően. A bőrt fertőtlenítik, majd vénába vezetnek egy tűt (kanült). Az infúziós palack/ampulla erre csatlakozik. Az infúzió ideje alatt nyugalomban kell feküdni. Az infúzió után a tűt eltávolítják, a szúrás helyét leragasztják, rövid ideig nyomni kell. Pár perc pihenés után hazamehet.

### Lehetséges, leggyakoribb szövődmények, mellékhatások (amit Ön érezhet)

Az infúzió a véna mellé folyik: feszítő, csípő érzés, helyi fájdalom. Vénagyulladás a szúrás helyén: vörösség, fájdalom, duzzanat. Vérömleny (kék folt) a szúrás helyén.

Emésztőrendszer: hányinger, hányás, gyomorfájdalom, hasmenés; ritkán gyomorvérzés vagy fekély. Központi idegrendszer, érzések: fejfájás, szédülés, forgó jellegű szédülés, álmoság, nyugtalanság; látászavar, hallásprobléma vagy tinnitus előfordulhat. Szív-érrendszer: kipirulás, hőérzet, szapora szívverés, vérnyomáscsökkenés (ritkán súlyosabb események). Allergia és bőr: kiütés, viszketés, angioödéma; ritkán súlyos, életet veszélyeztető allergiás reakció.

Orfenadrin-specifikus: szájszárazság, látászavar, vizeletürítési problémák, izommerevség vagy remegés ritkán.

Súlyos tünetek (légszervi nehézség, nagy kiterjedésű bőrkiütés, véres hányás, fekete széklet, ájulás) esetén azonnal értesítse a személyzetet vagy hívjon segítséget.

### **Mikor NEM adható / mire figyeljen?**

Ellenjavallt: ismert túlérzékenység diklofenákra, orfenadrinre vagy a segédanyagokra; korábbi NSAID-allergia (asztma, urticaria); aktív gyomor-vérzés vagy perforáció; ismétlődő gyomorfekély; súlyos máj- vagy vesebetegség; akut agyvérzés; súlyos szívelégtelenség, bizonyos súlyos szívbetegségek; terhesség utolsó 3 hónapja; szoptatás (tilos); 18 év alattiak.

Jeljeze, ha: korábban volt gyomor-bél problémája, szív-érbetegsége, magas vérnyomása, cukorbeteg, trombózis, vagy ha dohányzik.

Ampulla tartalmaz jelentős mennyiségű nátriumot, valamint benzil-alkoholt, szorbitot és metabiszulfidot - ha ezekre érzékeny, mondja el.

### **Gyógyszerkölsönhatások - mire figyeljen?**

Kerülje egyidejűleg más NSAID-okkal történő kezelést. Véralvadásgátlók, kortikoszteroidok, bizonyos antidepresszánsok (SSRI), diuretikumok, vérnyomáscsökkentők és egyes egyéb gyógyszerek mellett fokozott a vérzés-, vese- vagy vérnyomásprobléma kockázata — mindig mondja el, mit szed. Alkohol egyidejű fogyasztása növeli a gyomorvérzés kockázatát. Orvos dönt a további gyógyszerek folytatásáról és szükséges ellenőrzésekről.

Terhességben: általában kerülendő; az utolsó 3 hónapban tilos. Szoptatás: nem javasolt, beszélje meg az orvossal. Gépkocsi/munka: a készítmény szédülést, álmoságot vagy látászavart okozhat, óvatosan vezessen vagy kezeljen gépeket, ha ezek jelentkeznek.

### **Mit tegyen a kezelés után?**

Egy-két perc pihenés után távozhat. Ha a szúrás helyén fájdalom, vörösség vagy duzzanat jelentkezik, jelentse a kezelőnek vagy házi orvosának. Ha gyógyszeres mellékhatásokat vagy súlyos tüneteket észlel, haladéktalanul forduljon az egészségügyi személyzethez vagy hívjon segítséget.

Kérem, olvassa el a tájékoztatót otthon nyugodt körülmények között is. Ha elolvasta, tegye fel kérdéseit, javasolt a kérdéseket előre felírni; a felmerülő kérdésekre a kezelőorvos/nővér igyekszik választ adni. Amennyiben további részletes tájékoztatásra van szüksége, kérjük, egyeztessen időpontot vagy hívja a rendelőt így biztosan választ kap minden kérdésére.