

## Trental (pentoxifillin) - Tájékoztató infúziós kezelésről

### Mit kap és miért?

Trental (hatóanyag: pentoxifillin) a vér áramlását és a keringést javító gyógyszer. Infúzióban adják, ha szájon át nem lehetséges vagy gyors hatás szükséges (pl. súlyos keringési zavarok, fekélyek kiegészítő kezelése).

### A beavatkozás jellege és menete

Járóbetegként, orvosi vizsgálat után történik, orvos felügyeletével, képzett szakdolgozó végzi a szakmai protokolloknak megfelelően. A bőrt fertőtlenítik, majd vénába vezetnek egy tűt (kanült). Az infúziós palack/ampulla erre csatlakozik. Az infúzió ideje alatt nyugalomban kell feküdni. Az infúzió után a tűt eltávolítják, a szúrás helyét leragasztják, rövid ideig nyomni kell. Pár perc pihenés után hazamehet.

### Lehetséges, leggyakoribb szövődmények, mellékhatások (amit Ön érezhet)

Az infúzió a véna mellé folyik: feszítő, csípő érzés, helyi fájdalom. Vénagyulladás a szúrás helyén: vörösség, fájdalom, duzzanat. Vérömleny (kék folt) a szúrás helyén.

Gyógyszeres mellékhatások: hányinger, hányás, hasmenés, hasi panaszok, fejfájás, szédülés, aluszékonyság, szapora szívverés, ritmuszavarok, kipirulás, vérnyomáscsökkenés. Vérbizonyítványi eltérések (ritkán): thrombocytopenia, leukopenia. Bőrreakciók: viszketés, kiütés, urticaria, ritkán súlyos allergiás reakciók (angioödéma, anaphylaxia). Súlyos tünetek (pl. légzési nehézség, nagy kiterjedésű bőrkiütés, erős vérzés, ájulás) esetén azonnal jelezze a szakdolgozónak vagy az orvosnak.

### Mire figyeljen egyes állapotok és gyógyszerek esetén?

Ha Ön véralvadásgátlót vagy vérlemezke-gátlót szed, érzékeny vagy gyomorfekélye van: a Trental fokozhatja a vérzés kockázatát, tájékoztassa az orvost. Antidiabetikumok mellett vércukorszint-csökkenés előfordulhat, egyeztessen az orvossal. Ciprofloxacinnal, teofillin, K-vitamin-antagonisták és egyes egyéb gyógyszerek együttes adása esetén fokozott megfigyelés szükséges, mondja el, mit szed. Súlyos máj- vagy vesebetegség, súlyos szív- vagy érrendszeri problémák esetén az orvos külön figyelmet fordít a kezelésre. Terhesség alatt általában nem adható; szoptatásnál orvosi mérlegelés szükséges.

## **Egyéb választható kezelések**

Orvosa mérlegelheti a szájon át adható Trental folytatását (ha lehetséges), más gyógyszereket vagy alternatív kezelési lehetőségeket. Kérdezzen rá, ha szeretne alternatívát.

## **Mit tegyen a kezelés után?**

Egy-két perc pihenés után távozhat. Ha a szúrás helyén fájdalom, vörösség vagy duzzanat jelentkezik, jelentse a kezelőnek vagy házi orvosának. Ha gyógyszeres mellékhatásokat vagy súlyos tüneteket észlel, haladéktalanul forduljon az egészségügyi személyzethez vagy hívjon segítséget.

Kérem, olvassa el a tájékoztatót otthon nyugodt körülmények között is. Ha elolvasta, tegye fel kérdéseit, javasolt a kérdéseket előre felírni; a felmerülő kérdésekre a kezelőorvos/nővér igyekszik választ adni. Amennyiben további részletes tájékoztatásra van szüksége, kérjük, egyeztessen időpontot vagy hívja a rendelőt így biztosan választ kap minden kérdésére.